CERPO

Centro de Referencia Perinatal Oriente

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Patologías del arco aórtico

Dra. Isabel Pineda Bustos
Becada Ginecología y Obstetricia
Pontificia Universidad Católica de Chile
Enero 2021

Introducción

- Las cardiopatías congénitas (CC) son la principal causa de enfermedad y muerte por malformaciones al nacer.
- Incidencia: 0.8%-1% de los recién nacidos vivos.
- El 50% serán severas, requiriendo tratamiento quirúrgico en el 1º año de vida.
- Asociación con anomalías cromosómicas:
 - Aislada: 15-25%
- El riesgo de malformación extracardíaca se sitúa en un 25-40%.

Introducción

Las patologías del arco aórtico

- Incluye un grupo de anomalías congénitas de la posición o ramificación del arco aórtico
- Implicancias clínicas:
 - Algunas son anomalías posicionales y asintomáticas, en otros casos puede formarse un anillo vascular completo o incompleto que comprime tanto la tráquea como el esófago.
 - Se pueden acompañar de cardiopatías estructurales y/o asociarse a determinadas alteraciones cromosómicas
 - Pueden contribuir a la aparición de anomalías en el desarrollo de las estructuras traqueo-bronquiales

Introducción

- Previamente podían pasar desapercibidas, a no ser que se acompañaran de otras anomalías cardíacas.
- En los últimos años la generalización del uso de la imagen de los “3 vasos-Tráquea” ha permitido comprobar que estas alteraciones son más frecuentes de lo que se pensaba.

Epidemiología

- Incidencia: 1 x 1.000 RNV
 - Aisladas
 - Asociado a otras anomalías:
 - Cardiacas
 - Extracardiacas
 - Cromosomopatías (Microdelección 22q11)

Embriología del arco aórtico

- 4ta-5ta semana de gestación
- Origen: Saco aórtico (porción mas distal de tronco arterioso)
- 6 pares de arcos
- Puente entre aorta dorsal y ventral
- Desarrollo céfalo-caudal y asincrónico
- Desaparición escalonada
- Proceso dinámico y progresivo

Embriología

- Al formarse los arcos faríngeos, cada uno recibe su propia arteria, estas son llamadas arcos aórticos.
- A medida que el desarrollo continúa, desaparecen el 1er y 2do arco aórtico

Embriología

- El 3er arco aórtico forma la arteria carótida común y la primera parte de la arteria carótida interna. La carótida externa es un brote del 3er arco aórtico
- El 4to arco aórtico persiste en ambos lados
 - En el lado izquierdo forma parte del arco de la aorta, entre la carótida común izquierda y las arteria subclavia izquierda
 - En el lado derecho forma el segmento más proximal de la arteria subclavia derecha.

Anillos y Sling vasculares

- Estructuras anómalas capaces de comprimir la tráquea/esófago.
- 50% asociado a malformaciones cardiológicas
- Si no forman un anillo vascular completo se denominan sling

Diagnóstico prenatal

- La lateralidad del arco puede definirse en corte axial del mediastino superior, visualizando la posición relativa entre la tráquea y el arco.
- Imagen 3VT: es la más importante

En condiciones normales, el arco aórtico izquierdo cruza de derecha a izquierda y forma una V en su unión con el tronco pulmonar y el ductus. Quedando todas estas estructuras localizadas a la izquierda de la tráquea

Diagnóstico prenatal

- En un feto normal no debe existir ninguna estructura vascular por detrás de la tráquea.
- Cualquier vaso retrotraqueal que forma una imagen de “U”, “6” o “9” constituye una anomalía del arco aórtico.
- La imagen sagital: permite identificar los troncos supra aórticos

2. Aortic arch view

Diagnóstico prenatal

- Eco Doppler:
 - Para la correcta identificación de las alteraciones es necesario el uso simultáneo del Doppler color.
- En algunos estudios se ha documentado la utilidad de la exploración 3D complementada con Doppler Color o Power Doppler.

Clasificación

- Se basa en los siguientes aspectos:
 - La posición del arco aórtico respecto a la tráquea (izquierda o derecha)
 - Presencia o no de alguna estructura vascular que pase por detrás de la tráquea
 - Lateralidad del ductus arterioso

Clasificación

- Sin anillo vascular
 - Arco aórtico derecho con vasos en espejo
- Con anillo vascular
 - Doble arco aórtico
 - Arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante
- Con sling vascular
 - Arco aórtico izquierdo con arteria subclavia aberrante

Arco aórtico derecho con vasos en espejo

- En el arco aórtico derecho, el cuarto arco izquierdo y la aorta dorsal izquierda están obliterados y los vasos correspondientes del lado derecho los reemplazan

Arco aórtico derecho con vasos en espejo

- Diagnóstico ecográfico
- No forma anillo vascular
- Ductus arterioso izquierdo, comunica tronco pulmonar con arteria braquiocefálica o subclavia izquierda.
- Aorta ascendente se mantiene a la derecha, quedando un espacio entre la aorta ascendente y el tronco pulmonar

Arco aórtico derecho con vasos en espejo

Arco aórtico derecho con vasos en espejo

- Malformación del arco aórtico más frecuente (40-60% de las malformaciones del arco)
- Asociación con cardiopatías (hasta 90%)
 - Tetralogía de Fallot
 - Atresia pulmonar con CIV
 - DSVD
- Se asocia con malformaciones extracardiacas en el 20%
- Se puede asociar a Sd de Heterotaxia
- Asociación con microdelección 22q11

Arco aórtico derecho con arteria subclavia aberrante

- Regresión del arco aórtico izquierdo distal al nacimiento de la carótida común izquierda.
- El ductus arterioso izquierdo, comunica el tronco pulmonar con la arteria subclavia izquierda, quedando a la derecha de la aorta ascendente y arco derecho, formando un anillo vascular.

– En general más amplio que el provocado por el doble arco Ao, frecuentemente asintomático.

Diagnóstico ecográfico

- Imagen 3 vasos-T:
 - Aorta a la derecha de la tráquea. Forma “U” entre aorta y pulmonar envolviendo la tráquea
 - Subclavia izquierda posterior a la tráquea. Doppler de arteria aberrante es reverso

Arco aórtico derecho con arteria subclavia aberrante

- Se asocia en 10% a malformaciones congénitas
 - La más frecuente es la tetralogía de Fallot
- Asociación 10% de anomalías extracardiacas

Doble arco aórtico

- Se produce por la persistencia del 4to arco izquierdo y derecho.
- Es la variedad anatómica que con mayor frecuencia provoca un **anillo vascular sintomático**.
- Aunque ambos arcos suelen ser permeables, en el 70-90% de los casos el arco derecho es el de mayor tamaño, siendo hipoplásico el izquierdo.
 - 20% izquierdo dominante, 5% simétricos
- Por lo general solo persiste el ductus izquierdo
- Los dos arcos se unen para originar la aorta descendente

Doble arco aórtico

- Ecografía
 - 3 vasos-T: Se observa ambas aortas envolviendo la tráquea, formando un 6 0 9
 - Coronal: presencia de ambas arterias subclavas saliendo de su propia aorta

* Ambos arcos pueden estar en distinto plano por lo que puede ser necesaria la oscilación leve del transductor.

Doble arco aórtico

Doble arco aórtico

- Habitualmente es una anomalía aislada
- En 20% se acompaña de una cardiopatía congénita
- Asociación con otras malformaciones extracardiacas 5-10%

Arco aórtico izquierdo con subclavia derecha aberrante

- Origen anómalo de la arteria subclavia derecha,
 - Nace directamente desde el arco aórtico descendente y distal a la arteria subclavia izquierda.
- Incidencia 1-2% de población normal
- Generalmente asintomática. Hallazgo incidental.
- > frecuente en sexo femenino

Arco aórtico izquierdo con subclavia derecha aberrante

- Ecografía:
 - En imagen de 3 vasos-T:
 - Imagen normal de los grandes vasos. Posterior a tráquea se observa subclavia cruzando de izquierda a derecha.

Arco aórtico izquierdo con subclavia derecha aberrante

- Asociación con Trisomía 21 en hasta 30%
- La presencia de ARSA se considera factor de riesgo para presentar otras cardiopatías congénitas y alteraciones vasculares.

Interrupción de arco aórtico

- Malformación poco frecuente
- Atresia localizada entre la aorta ascendente y la aorta descendente.
 - Pudiendo ser falta de continuidad completa o existir un cordón atrésico entre ambos extremos.
- Incidencia 2-3 x 1.000.000 RN

Interrupción de arco aórtico

- La mayoría (70-80%) se asocia con CIV
- Se asocia a elevada mortalidad en el periodo neonatal si no es tratada

Interrupción de arco aórtico

- Se clasifica en 3 tipos
 - Tipo A. La obstrucción se sitúa a nivel del istmo aórtico: distal a la arteria subclavia izquierda. (30%)
 - Tipo B. Entre la arteria carótida izquierda y la subclavia izquierda. Es el tipo más frecuente. (50-60%)
 - Tipo C. Entre el tronco braquiocefálico y la arteria carótida izquierda. (10%)

Interrupción de arco aórtico

- Sospecha:
 - Asimetría de ventrículos y grandes vasos (>derecha)
 - Más evidente a mayor edad gestacional
 - Ramas pulmonares habitualmente dilatadas
 - En corte sagital no se logra visualizar toda la curvatura del arco aórtico. Aorta ascendente sigue un trayecto recto
 - Cuando existe duda IAA y coartación/hipoplasia del arco
 - Doppler color: si se detecta perfusión revertida del arco aórtico desde el ductus → descarta IAA

Interrupción de arco aórtico

- Se asocia con distintas anomalías cardíacas, la frecuencia va a variar dependiendo del tipo de IAA
 - CIV
 - ARSA
 - Menos frecuentes: TGA, tronco arterioso.
- Anomalías extracardiacas
- Cromosomopatías: microdelección 22q11 (hasta 50% en tipo B). Timo hipoplásico.

CERPO

Centro de Referencia Perinatal Oriente

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Patologías del arco aórtico

Dra. Isabel Pineda Bustos

Becada Ginecología y Obstetricia

Pontificia Universidad Católica de Chile

Enero 2021

CERPO