CERPO

Centro de Referencia Perinatal Oriente

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Emergencias de la vía aérea al nacimiento

Dra. Trinidad Pinochet de la Jara

Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Introducción

- Avances en la atención prenatal, tecnología e imagenología han permitido la sospecha y confirmación de anomalías congénitas previamente diagnosticadas al nacimiento.
- El conocimiento de estas alteraciones ha permitido la planificación adecuada e incluso tratamientos durante el periodo prenatal.
- El manejo oportuno de la vía aérea disminuye el riesgo de hipoxia, acidosis y sus complicaciones como el deterioro neurológico.

Emergencias vía aérea

Frequent diagnoses posing potential airway emergencies in the neonate.

Level of obstruction	Conditions
Nasal	Choanal stenosis Choanal atresia Nasal encephalocele Nasal dermoid Pyramidal aperture stenosis Nasal cyst Nasal septal deviation Tumor/teratoma
Pharyngeal	Nasal polyps Vallecular cyst Cleft palate Tumor/teratoma Micro/retrognathia Macroglossia Hypotonia/reduced pharyngeal tone
Cervical	Lymphatic malformations (cystic hygroma) Teratoma
Laryngeal	Laryngomalacia Laryngeal cleft Ventricular or other laryngeal cysts Subglottic stenosis Vocal cord paralysis
Tracheal	Congenital tracheal stenosis Complex tracheomalacia (esophageal atresia) Vascular ring Tracheal cyst
Bronchial Pulmonary	Bronchial tumors Bronchopulmonary dysplasia Congenital cystadenomatoid malformation
Chest wall (mechanical/ neuromuscular)	Asphyxiating thoracic dystrophy
Multiple craniofacial/ airway anomalies	Muscular dystrophies Pierre Robin sequence Treacher Collins syndrome Crouzon syndrome Apert syndrome Trisomy 21 Beckwith–Wiedemann syndrome

- Vía aérea difícil: anestesista con experiencia encuentra dificultad para ventilación, intubación o ambos.
- Vía aérea crítica: situación en que la ventilación bolsa-mascarilla es frustra y se requiere intubación endoscópica por ORL de alto nivel para establecer una vía.

Atresia/estenosis coanas

- Causa más común de obstrucción nasal neonatal
- Persistencia de la membrana bucofaríngea
- 1:10000 NV
- Atresia bilateral constituye una emergencia, presentando distress respiratorio inmediato y necesidad de vía aérea oral o intubación oro-traqueal.
- Ósea, membranosa o mixta.

Figure 2. Choanal atresia. A. Presurgical view from oropharynx. B. Postsurgical view from oropharynx demonstrating bilateral openings into the nasal cavity.

Atresia/estenosis coanas

- Sospecha clínica:
 - Distrés respiratorio con cianosis que disminuye con el llanto.
 - Imposibilidad de pasar un cateter por vía nasal.
- Dg diferencial: desviación septal, dislocación septal, masas nasales, encefalocele.
- CHARGE: Coloboma, Heart defects, Atresia of the coanae, Growth retardation, Genitourinary abnormalities, Ear deformities (50%)

Estenosis congénita apertura piriforme

- Presentación similar a atresia coanas
- Menor frecuencia
- Estrechamiento óseo anterior
- Asociación a defectos de la línea media: holoprosencefalia, hipopituitarismo, displasia septo-óptica

Fig. 2. Computed tomography of choanal atresia (a), piriform aperture stenosis (b). (Adapted with permission from Lily J. Sobol S, editors. Disorders of the neonatal airway: fundamentals for practice, p. 133. © Springer, 2015.)

Teratomas orales y cervicales

- Malformación congénita que contiene tejido endodérmico, mesodérmico y ectodérmico.
- Se originan de la migración anormal o secuestro de células germinales.
- 5-10% se encuentran en cabeza y cuello.
1:20.000 a 1:40.000 NV

Fig. 2. Neonate with a large oral cavity congenital teratoma delivered via ex utero intrapartum treatment (EXIT). The patient's airway was intubated at the time of EXIT.

Teratomas orales y cervicales

- US: masa heterogénea con componentes sólidos y quísticos. Calcificaciones internas
- RM: masa heterogénea bien circunscrita, multiloculada. Frecuente compromiso tiroides.
- Aproximadamente 20% de los teratomas de cabeza y cuello presentan PHA, indicando obstrucción de la vía digestiva y aérea superior.

Micrognatia

- Tamaño anormal de la mandíbula, con o sin retrognatia (posición anormal).
- En casos severos, puede producir glosoptosis, con la consiguiente obstrucción de la vía aérea superior.
- Un 66% se asocia a aneuploidías.
- La mayoría asociada a otras malformaciones: 80% musculoesqueléticas, 60% genitourinarias, 60% cardiovasculares.

Micrognatia

- US: alteración del perfil fetal. Índice mandibular (*jaw index*) <p5 o <23 (100% sensibilidad, 98.7% especificidad)
- Micrognatia severa y PHA concomitante pueden predecir obstrucción de VA.

Box 3

Calculating the jaw index

$$\text{Jaw Index} = \frac{\text{Anterior} - \text{Posterior Diameter}}{\text{Biparietal Diameter}} \times 100$$

Data from Paladini D, Morra T, Teodoro A, et al. Objective diagnosis of micrognathia in the fetus: the jaw index. *Obstet Gynecol* 1999;93(3):382-6.

Malformaciones venolinfáticas

- Masa cervical más comúnmente diagnosticada en el período fetal.
- Falla en el contacto de los canales linfáticos con el sistema venoso yugular.
- Hallazgo 3er trimestre: cuello anterior, anomalía aislada. Compromiso de otras estructuras.

Malformaciones venolinfáticas

- US: lesiones quísticas, señal Doppler ausente.
- RM: permite delimitar los márgenes de la lesión.
- Menos destructivos que teratomas, causan menos distorsión de la vía aérea, pero el compromiso faríngeo y laríngeo es común.

CHAOS: Congenital High Airway Obstruction Syndrome

- Raro. Incidencia real desconocida, se estima 1:50000 NV
- Obstrucción vía aérea: atresia/estenosis de laríngea o tráquea
- Acumulación de líquido en la vía aérea inferior, expansión pulmonar que comprime pulmón y diafragma.

CHAOS: Congenital High Airway Obstruction Syndrome

- US: dilatación vía aérea, pulmones grandes hiperecogénicos, desplazamiento silueta cardíaca, aplanamiento o inversión diafragma, ascitis/hidrops fetal, PHA
- RM: columna de fluido en la vía aérea. Permite confirmar la zona de obstrucción.

Ultrasonografía

- Evaluación de la anatomía fetal normal y anormal
- Ecografía 3D permite calculo de volúmenes, sin embargo no se ha establecido la superioridad de 3D y 4D en el diagnostico.
- Signos indirectos de obstrucción VA: PHA, pequeña burbuja gástrica, orofaringe prominente, hidrops.

Resonancia magnética fetal

- Excelente resolución de tejidos blandos
- RM post US:
Confirmó la imagen en 89%, contradijo el diagnóstico en 4%, no se encontraron anomalías 7%. Cambio en diagnóstico y pronóstico de 20% de pacientes.
- **¿Cuándo?** Preferiblemente durante 3er trimestre. Podría requerir un segundo examen cercano a la fecha probable de parto para caracterizar adecuadamente el grado de obstrucción de VA (evolutivo)

Table 2
Information Provided by Fetal US vs Fetal MR Imaging Performed
Prior to an EXIT Procedure

Information	US	MR Imaging
Size and location of the lesion	Yes	Yes
Infiltrative characteristics of the mass	Yes	Yes
Tissue characteristics of the lesion*	Yes	Yes
Fetal respiration function	Yes	No
Fetal swallowing function	Yes	Yes
Amniotic fluid volume	Yes	Yes
Fetal airway distortion	No	Yes
Anatomic location of the tongue	No	Yes
Presence of associated anomalies	Yes	Yes
Global anatomy (in conjoined twins)	No	Yes

*Depends on tissues involved; calcifications are variably seen at US.

Broncoscopía virtual

- Permite una adecuada visualización de la vía aérea fetal mediante un modelo 3D en base a la RM.
- El software permite posicionar “cámaras virtuales” permitiendo confirmar la permeabilidad de vía aérea.

Broncoscopía virtual

Virtual bronchoscopy for evaluating cervical tumors of the fetus

H. WERNER*†, J. R. LOPES DOS SANTOS‡§, R. FONTES‡§, S. BELMONTE‡, P. DALTRO*†¶, E. GASPARETTO*†, E. MARCHIORI† and S. CAMPBELL**

ULTRASOUND
in Obstetrics & Gynecology

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

The leading peer-reviewed journal on imaging within the field of Ob/Gyn
Editor-in-Chief: Basky Thilaganathan

Virtual bronchoscopy for evaluating cervical tumors of the fetus

H. Werner, J. R. Lopes Dos Santos, R. Fontes, S. Belmonte, P. Daltro, E. Gasparetto, E. Marchiori, and S. Campbell

Ultrasound Obstet Gynecol 2013; **41**: 90–94

ULTRASOUND
in Obstetrics & Gynecology

Clin Perinatol 45 (2018) 609–628

Ultrasound Obstet Gynecol 2013; **41**:90–94

Virtual bronchoscopy for evaluating cervical tumors of the fetus. ISUOG Team. <https://youtu.be/Gqx-cErNQho>

Impresión 3D

- Impresión de modelos individuales tridimensionales.
- Propósitos educativos y de planificación quirúrgica.

Antenatal Three-Dimensional Printing of Aberrant Facial Anatomy

Kyle K. VanKoeveering, MD^a, Robert J. Morrison, MD^b, Sanjay P. Prabhu, MBBS^{b,c}, Maria F. Ladino Torres, MD^d, George B. Mychaliska, MD^e, Marjorie C. Treadwell, MD^f, Scott J. Hollister, PhD^g, Glenn E. Green, MD^h

Traqueoscopia fetal

- Trocar uterino permite ingresar un cateter y un fetoscopio flexible.
- Permite examinar la vía aérea fetal y la instalación de un tubo endotraqueal.

Fetal Endoscopic Tracheal Intubation: A New Fetoscopic Procedure to Ensure Extruterine Tracheal Permeability in a Case with Congenital Cervical Teratoma

Rogelio Cruz-Martinez^{a, b, d} Oscar Moreno-Alvarez^c Maritza Garcia^b
Hugo Pineda^b Miriam A. Cruz^a Cecilia Martinez-Morales^a

CEDDO

Color version available online

Color version available online

Predicción: micrognatia

- Ángulo facial inferior (IFA): $<49.2^\circ$
retrognatismo (-2DS)
- Ratio mandíbula/maxilar:
 <0.785 micrognatismo

Predicción: TEDI score

- Índice de desplazamiento traqueo-esofágico
- Suma de los desplazamientos ventral y lateral del complejo traqueo-esofágico con respecto a la porción ventral de la columna vertebral (RM)
- >12 mm: VA complicada, S 67%, E 100%

Predicción: volumen

- Volumen de la masa (3 diámetros x 0,523) dividido por circunferencia cefálica
- Relación >1.6 se asocia a:
 - Mal pronóstico
 - Aparición de hidrops
 - Desviación mediastino
 - Ingreso UCI

Otros predictores de obstrucción

- Masa cervical gigante (>3.5 cm)
- Extensión cefálica fetal in útero
- Polihidroamnios
- Teratoma

Box 1

Important ultrasound descriptors of fetal cervicofacial masses

- Anterior versus posterior location
- Echogenicity of lesion
- Homogeneous versus heterogeneous echotexture
- Forced extension of the neck
- Presence of other anatomic anomalies
- Amniotic fluid index

EXIT: EX utero Intrapartum Treatment

- OOPS: Operation on placental support (1989)
- Desarrollo del procedimiento EXIT para el manejo de fetos con hernia diafragmática previamente tratados (1997)

THE AMERICAN JOURNAL OF PERINATOLOGY/VOLUME 6, NUMBER 1 January 1989

ANESTHESIA FOR PERINATAL SURGERY

*Mark C. Norris, M.D., Jeffrey Joseph, D.O.,
and Barbara L. Leighton, M.D.*

Operating on Placental Support: The Ex Utero Intrapartum Treatment Procedure

By George B. Mychaliska, John F. Bealer, Joy L. Graf, Mark A. Rosen, N. Scott Adzick, and Michael R. Harrison
San Francisco, California

EXIT: EX utero Intrapartum Treatment

- Manejo multidisciplinario:
 - Obstetras
 - Neonatólogos
 - Anestésistas
 - Cardiólogos
 - Cirujanos infantiles
- Nacimiento controlado, con la intención de mantener una vía aérea permeable y segura, mientras permanece intacta la circulación placentaria.
- Objetivo primario: minimizar riesgo de hipoxia y sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo.

EXIT: EX utero Intrapartum Treatment

- Children's Hospital of Philadelphia
- 1996-2002
- 43 casos: 19 masas cervicales, 3 CHAOS
- Promedio 28,9 minutos de mantención de circulación

Ex Utero Intrapartum Therapy

By Holly L. Hedrick
Philadelphia, Pennsylvania

Table 1. EXIT Procedure Data

Indication	Mean Gestational Age at EXIT (wk)	Mean EXIT Duration (min)	Long-term Neonatal Survival (%)
Neck mass (n = 19)	36.1 ± 2.6	29.9 ± 15.4	16/19 (84.2)
Reversal TO (n = 13)	31.8 ± 2.7	26.7 ± 6.3	5/13 (38.5)
CCAM (n = 5)	35.4 ± 4.8	63.8 ± 4.2	4/5 (80)
CHAOS (n = 3)	33.4 ± 3.4	35 ± 10	3/3 (100)
EXIT-to-ECMO (n = 1)	36.6	58	0/1
Pulmonary agenesis (n = 1)	39	14	1/1
Bridge to separation conjoined twins (n = 1)	34	43	1/1
Overall (n = 43)	34.5 ± 3.5	33.8 ± 16.9	30/43 (69.8)

Abbreviation: TO, tracheal occlusion.

EXIT: indicaciones

Table 1
Indications for an EXIT Procedure

EXIT-to-airway procedure

- Neck mass with obstruction (eg, cervical teratoma, vascular/lymphatic malformation, goiter, neuroblastoma)
- Congenital high airway obstruction syndrome
- Tracheal atresia
- Laryngeal atresia
- Micrognathia
- Other causes of airway obstruction

EXIT-to-resection procedure

- Chest masses with intrathoracic airway obstruction
- Congenital pulmonary airway malformation
- Bronchopulmonary sequestration
- Mediastinal teratoma
- Pericardial teratoma

EXIT-to-ECMO procedure

- Severe CDH
- Severe congenital heart disease

EXIT-to-separation procedure

- Conjoined twins

Note.—ECMO = extracorporeal membrane oxygenation.

EXIT: procedimiento

- Equipo multidisciplinario
- Relajación uterina mantenida y volumen uterino permiten conservar la circulación placentaria
- Rol esencial del anestesista: mantener relajación uterina y estabilidad hemodinámica.

Figure 13. Chart illustrates an algorithm for fetal airway management during an EXIT procedure.

Gracias